

畜産 FAX 情報 第5号

令和7年 6月 25日

発行:ゆとりみらい21農業推進協議会指導部会

1.一番草収穫後の草地管理

ギシギシ類の駆除

ギシギシ類を駆除する場合は、ギシギシの葉が「手のひらくらいの大きさ」に展開してから薬剤を散布しましょう。散布時期は一番草収穫後2～4週間が目安となります。

除草剤名	使用時期	10a 当り 製品使用量	希釈水量	注意事項
ハーモニー DF	ギシギシ類の草丈 20cm 以下	新播 0.5～1.0g 経年 3g	通常散布 50～100 ℓ/10a 少量散布 10～50 ℓ/10a	1. クローバーに対する薬害が著しい。 2. 散布後 21 日間は採草および放牧を行わない。 3. 高温時の散布はイネ科牧草の生育停滞が著しい。

※使用後のタンク等は必ず専用の洗浄剤を使用して洗浄してください。

2.牧草の夏更新のポイント

地下茎イネ科雑草(シバムギ・リードなど)を抑えるには、グリホサート系除草剤を根まで移行させる必要があります。除草剤を散布の際は以下の点に留意します。

- ① 1番草収穫後、イネ科雑草の草丈が 40cm 程度(リードの場合60cm程度まで可)になった頃に散布。
- ② 除草剤散布から耕起作業まで 10 日以上あけて、薬剤を根まで浸透させる。

図. 更新のスケジュール

