畜産 FAX 情報　第８号

令和７年８月１５日

発行：ゆとりみらい２１農業推進協議会指導部会

1. 二番草収穫後のギシギシの駆除

ギシギシ類の葉が手のひらくらいの大きさに展開した頃（草丈 15cm～20cm）が除草剤散布の目安となります。

アージラン液剤は「秋処理/最終採草後」に使用する薬剤ですが、高温時（最高気温 25 度以上）では、薬害が生じるおそれがあるので使用しないで下さい。高温が続く場合はハーモニーDF 水和剤を使用して下さい。

2. チモシーの夏枯れ対策

高温少雨やアルファルファの過繁茂により、一部のほ場でチモシーの夏枯れが見られます。二番草収穫後は圃場を観察し、裸地が多い場合は追播を行いましょう。

3. サイレージ用とうもろこしの収穫時期

85～90 日クラスのサイレージ用とうもろこしは、は種日からの単純積算気温が約 2,200～2,300 度で黄熟期を迎えます（表１）。例えば５月 15 日には種した場合、収穫適期の**黄熟期は９月５日の見込みです**（表２）。

今後の気温によっては登熟がさらに早まる可能性があるため、ほ場を確認し、早めの収穫準備を行いましょう。

表１　は種日からの単純積算温度と生育ステージの目安
（HP パイオニアより）

	75/82日クラス	85/90日クラス	95/100日クラス
黄熟期	2,100～2,250	2,200～2,300	2,200～2,350

表２　は種日ごとの単純積算温度の到達予測

は種日	単純積算温度の到達予測		
	2,200℃	2,300℃	2,350℃
5/5	8/30	9/4	9/7
5/10	9/2	9/7	9/10
5/15	9/5	9/11	9/13
5/20	9/9	9/15	9/18

※8 月 12 日以降の気温は過去５年間の平均値を使用

表１　黄熟期の判定方法

- 子実表面の水分が抜けて爪で押さえてもつぶれづらく胚乳部分がポロポロ崩れる。
- 子実の品種によっては頂部が凹む。
- 子実の付け根部分が黒っぽく変色する。
- 子実の黄色と白色の境目（ミルクライン）が芯の方から1/2～1/3部分に見られる。
- ミルクラインは先端側断面で評価する。



ミルクライン