

農産 F A X 情報 第 11 号

令和 7 年 10 月 15 日
ゆとりみらい 21 推進協議会 指導部会 幕別町忠類地区

1 秋まき小麦

○雪腐病の防除

- ・降雪が始まる 11 月中旬をめどに薬剤散布を行いましょう。薬剤散布後に降雨があると防除効果が低下する恐れがあります。降雨により再度散布する場合は、使用回数に注意する必要があります。

表 1 雪腐病の防除薬剤例

薬剤名	系統	希釈倍率 (倍)	使用時期 (収穫前日数)	使用回数 (以内)	大粒 菌核病	黒色小粒 菌核病	褐色小粒 菌核病	紅色 雪腐病
フロンサイド SC	他合成	1,000	根雪前	2	○	○	○	○
トップジン M 水和剤	MBC	2,000		3	○	—	—	—

※トップジン M 水和剤は赤かび病、うどんこ病、眼紋病にも登録があるため、本剤の使用を計画する際は使用回数に注意しましょう。

表 2 雪腐病防除 再散布の目安

薬剤名	散布から根雪までの降水量
フロンサイド SC	積算降水量 120mm もしくは日最大降水量 65mm
トップジン M 水和剤	積算降水量 80mm もしくは日最大降水量 40mm

収穫作業時の機械調整は、**必ずエンジンを停止してから！**

日没が早くなっております。**早めのライト点灯・反射版の取り付けを！**