農産ＦＡＸ情報　第11号

令和８年10月15日
ゆとりみらい21推進協議会 指導部会 幕別町忠類地区

１　秋まき小麦

○雪腐病の防除

・良質麦の安定生産に向け、根雪前までに雪腐病の薬剤防除を行いましょう。薬剤の防除効は、散布から根雪までの期間が長いと降雨により低下します。そのため、根雪に近い時期に散布することが望ましいです。また、残効性に優れる薬剤を用いることで、根雪直前より早期の防除でも安定した効果が期待できます(表1,2)。

表１　雪腐病の防除薬剤例

薬剤名	RACコード	使用濃度(倍)	使用回数(以内)	使用時期	紅色雪腐病	黒色小粒雪腐病	褐色小粒雪腐病	大粒菌核病
フロンサイドSC	29	1,000	2	根雪前	○	○	○	○
トップジンM水和剤	1	2,000～2,500	3		×	×	×	○
シルバキュアフロアブル	3	1,000～2,000	1		×	○	○	×

表２　雪腐病防除　再散布の目安（H26普及推進事項）

薬剤名	根雪日までの積算降水量	
	雪腐大粒菌核病	雪腐黒色小粒菌核病
フロンサイドSC	120mm（日最大降水量65mm）	120mm（日最大降水量65mm）
トップジンM水和剤	80mm（日最大降水量40mm）	-
シルバキュアフロアブル	-	100mm(日最大降水量40mm)

収穫作業時の機械調整は、**必ずエンジンを停止してから！**

日没が早くなっております。**早めのライト点灯・反射板の取り付けを！**