

# 畜産 FAX 情報 第2号

令和7年5月15日

発行:ゆとりみらい 21 推進協議会 指導部会 幕別町忠類地区

サイレージ用とうもろこしの播種が進んでいます。播種が終わると除草剤の散布が開始します。資材の確認を行い、ほ場にあった除草剤を選択しましょう。

## 1 サイレージ用とうもろこしの土壌処理剤・茎葉処理剤

表1 サイレージ用とうもろこしの主な土壌処理除草剤

| 主な対象雑草   | 除草剤名         | 使用時期          | 10a 当たり<br>使用量 | 総使用回数により2回<br>散布できない除草剤      |
|----------|--------------|---------------|----------------|------------------------------|
| 1年生イネ科雑草 | フィールドスターP 乳剤 | は種後～2葉期       | 75～<br>120ml   | 同剤                           |
| 1年生イネ科雑草 | ラクサー乳剤       | は種後～出芽前       | 400～<br>600ml  | 同剤                           |
| 1年生雑草    | ゲザノンゴールド     | は種後～出芽前       | 140～<br>260ml  | 同剤<br>ゲザプリムフロアブル<br>デュアルゴールド |
| 1年生広葉雑草  | ゲザプリムフロアブル   | は種後～2～4<br>葉期 | 100～<br>200ml  | 同剤<br>ゲザノンゴールド               |

表2 サイレージ用とうもろこしの主な茎葉処理除草剤

| 主な<br>対象雑草              | 除草剤名              | 使用時期      | 10a 当り<br>使用量 | 使用回数 | 主な注意事項                                                                                                                                |
|-------------------------|-------------------|-----------|---------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1年生雑草                   | アルファード液<br>剤      | 作物 3～5 葉期 | 100～<br>150ml | 1    | 散布時の展開葉に薬害(黄斑)を生じる場合がある。 <u>イヌホオズキ・シロザ・イチビに効果がある。</u>                                                                                 |
|                         |                   | 作物 6～7 葉期 | 150ml         |      |                                                                                                                                       |
| 1年生雑草                   | ブルーシア<br>フロアブル    | 作物 3～5 葉期 | 40～50ml       | 1    | 散布時の展開葉に薬害(黄斑)を生じる場合があるが、その後の生育には影響がない。 <u>イヌホオズキ・シロザ・イチビに効果。</u> 雑草発生の多い圃場では、初期生育での競合が懸念されるため、土壌処理剤との併用が望ましい。<br>-----<br>無人航空機による散布 |
|                         |                   | 作物 6～7 葉期 | 50～75ml       |      |                                                                                                                                       |
|                         |                   | 作物 3～7 葉期 | 50ml          |      |                                                                                                                                       |
| 1年生雑草                   | ゲザノン<br>ゴールド      | 作物 2～4 葉期 | 140～<br>200ml | 1    | 砂土では使用しない。極端な過湿土壌および砂質土壌では生育が抑制することがあるので薬量を少なくする。(注1)(注2)                                                                             |
| 1年生<br>広葉雑草             | ゲザプリム<br>フロアブル    | 作物 2～4 葉期 | 100～<br>200ml | 1    | 砂土系で透水性のよい圃場や、多雨の降雨が続く時期の散布は薬害の恐れがあるので使用を避ける。(注1)                                                                                     |
| 1年生雑草及<br>び多年生イ<br>ネ科雑草 | ワンホープ<br>エース OD   | 作物 3～5 葉期 | 100～<br>200ml | 1    | 品種により薬害が生じる恐れがある。天候によって黄化・黄斑が見られる場合あり。 <u>シバムギ・リードカナリグラスに効果。</u><br>※適用品種一覧を要確認                                                       |
| ギンギン類                   | ハーモニー<br>75DF 水和剤 | 作物 3～4 葉期 | 2g            | 1    | 砂土では使用しない。茎葉処理剤のためギンギンの葉が展開してから行う。                                                                                                    |

注1)アトラジンを含む農薬(ゲザノンゴールド、ゲザプリムフロアブル)の総使用回数は1回 注2)デュアルゴールドを土壌処理剤として使用した場合、総使用回数によりゲザノンゴールドを茎葉処理剤として使用することはできません。