農 業 技 術 情 報

令和8年11月13日

ゆとりみらい21推進協議会指導部会

十勝普及センター十勝東部支所　015-572-3128
ＪＡ幕別町　0155- 54-4118
ＪＡさつない　56-2131
ＪＡ帯広大正　64-4591
幕別町農林課　54-6605

2027年産秋まき小麦の越冬前生育状況

○越冬前調査結果（11／13実施;町内定点ほ14カ所平均）

定点ほ	は種期	茎数（本／㎡）	草丈（cm）	葉数（枚）	越冬前積算気温（℃）
2027 年産	9 月 25 日	985	17.9	4.8	483
【参考】					
2026 年産	9 月 28 日	877	14.8	4.5	451
2025 年産	9 月 25 日	1,266	21.0	5.7	518
2024 年産	9 月 27 日	1,325	18.1	5.6	553
平年	9 月 24 日	1,199	17.5	5.3	445

は種後は晴天が多く、9月5半旬から 11 月2半旬までの越冬前積算平均気温は483℃（平年同期間では445℃、昨年は451℃）と、平年比109%となっています【糠内アメダス】。

は種期は平均すると平年並ですが、ほ場のは種日により生育差がみられます（目標葉数:5枚）。

遅まきによる葉数3枚前後での越冬は、種子の栄養がなくなるいわゆる「離乳期」に該当し、雪腐病や冬損などへの耐性（越冬性）が劣ります。

また、今年の秋は降水量が少なく、再散布の目安（散布後積算降水量120mm・日最大降水量65mm 以上・ﾌﾛﾝｻｲﾄﾞ SC）をまだ超えていませんが、これから雪腐病防除を行う場合、なるべく早く実施しておきましょう。また、春先は早期に起生できるよう、融雪材散布を適切に行うことが重要です。

越冬後は生育状況を見て追肥を判断します。

【雪腐病防除薬剤例】
フロンサイド SC （1,000 倍） 2 回
トップジン M （2,000 倍） 3 回
ｼﾙﾊﾞｷｭｱﾌﾛｱﾌﾞﾙ（2,000 倍） 根雪前 1 回

日没が早まりました。早めのライトオンで
薄暮時の農作業には十分注意しましょう