

# 当面の技術対策（畜産編）

令和元年7月1日

発行：ゆとりみらい21農業推進協議会指導部会

1 番草の収穫作業が終盤となっています。2 番草に向けた追肥について ①チモシー主体草地は、刈り取り後10日目くらいまで ②オーチャードグラス主体草地は、刈り取り後出来るだけ早く実施しましょう。また、良質粗飼料確保に向けて、以下のことを再度確認し必要に応じて作業を実施して下さい。

## 1 新播草地の掃除刈りについて

春更新した草地で、アカザ・タデ類などの一年生の広葉雑草が目立つほ場が見られます。そのような草地では掃除刈りを実施しましょう。掃除刈りのタイミングは、播種後40～60日（雑草の草丈が20～30cm）ころが目安となりますが、雑草の生育が旺盛で、草丈がそれ以上の場合は、できるだけ早く（雑草が種子をつける前に）掃除刈りを実施して下さい。

## 2 1 番草収穫後のギシギシ類の駆除

ハーモニー水和剤でギシギシ類を駆除する場合は、ギシギシが「手のひらくらいの大きさ」になってから散布しましょう。散布時期は1 番草収穫後2～4週間が目安となります。一方、本剤はクローバに対して強い薬害を生じるため、注意しましょう。

表1 ハーモニー水和剤の使用基準

薬剤名	適応草種	10a 当たり 薬剤量	使用時期	10a 当たり 水量
ハーモニー 75DF 水和剤	<u>経年草地</u> イネ科単播草地および アルファルファとの混 播草地	3g	・夏および秋処理 ・採草21日前まで	100 リットル
	アルファルファ主体の 混播草地	2～3g		
	<u>新播草地</u>	0.5～1g	・夏および秋処理 ・採草21日前まで ・ギシギシの草丈 20cm以下	

※本剤の使用回数は1回

※使用後のタンク等の洗浄は他の作物に対する薬害の原因にならないよう必ず専用の洗浄剤で洗浄して下さい。

## 3 夏更新に向けた草地の雑草処理

雑草が多い草地は更新を検討しましょう。地下茎イネ科雑草（シバムギ・リードカナリーグラスなど）が多い場合は、必ず既存植生を枯殺処理してから耕起して下さい。この場合、草丈が短いと枯殺効果が劣ります。既存植生の草丈が30～40cm程度になるのを待って除草剤を散布しましょう。また、処理後の枯殺期間は10～14日間確保して下さい。さらに、は種床造成後、雑草が出揃う（30日以上）のを待って、再度、除草剤を散布すると効果的です（表2）。

表2 1 番草収穫後の草地更新スケジュールの例（除草剤2回処理）

収穫	⇒	除草剤散布 グリホサー ト系除草剤 雑草の草丈 30～40cm	⇒	枯 殺	⇒	耕起・砕土 整地・鎮圧	⇒	雑草が出揃 うのを待つ 30日以上	⇒	除草剤散布 グリホサー ト系除草剤	⇒	施肥・は種 ・鎮圧
----	---	---	---	--------	---	----------------	---	-------------------------	---	-------------------------	---	--------------

※枯殺期間は10～14日を確保する