

# 当面の技術対策（畜産編）

令和5年6月1日

発行：ゆとりみらい21農業推進協議会指導部会

## 1 サイレージ用とうもろこしの除草作業

サイレージ用とうもろこしの生育は順調に推移しています。茎葉処理除草剤はサイレージ用とうもろこしの葉数を確認し、タイミングを逃さずに散布する必要があります（表1）。ほ場をよく確認して茎葉処理剤を散布しましょう。

表1 サイレージ用とうもろこしの主な茎葉処理除草剤

主な対象雑草	除草剤名	使用時期	10a 当り 使用量	使用回 数	主な注意事項
1年生雑草	アルファード液剤	作物3～5葉期	100～ 150ml	1	散布時の展開葉に薬害（黄斑）を生じる場合があるが、その後の生育、収量には影響がない。
		作物6～7葉期	150ml		
1年生雑草	ブルーシアフロアブル	作物3～5葉期	40～50ml	1	散布時の展開葉に薬害（黄斑）を生じる場合があるが、その後の生育、収量には影響がない。 雑草発生の多い圃場では、初期生育での競合が懸念されるため、土壌処理剤との併用が望ましい。
		作物6～7葉期	50～75ml		
1年生雑草	ゲザノンゴールド	作物2～4葉期	140～ 200ml	1	砂土では使用しない。 極端な過湿土壌および砂質土壌では生育が抑制することがあるので薬量を少なくする。（注1）（注2）
1年生 広葉雑草	ゲザプリムフロアブル	作物2～4葉期	100～ 200ml	1	砂土系で透水性のよい圃場や、多雨の降雨が続く時期の散布は薬害の恐れがあるので使用を避ける。（注1）
1年生雑草	ワンホープ乳剤	作物3～5葉期	100～ 150ml	1	品種により薬害が生じる恐れがある。 散布数日後一時的に褪色及び生育抑制を生ずることがある。
1年生雑草 及び 多年生イネ科雑草	ワンホープエースOD	作物3～5葉期	100～ 200ml	1	品種により薬害が生じる恐れがある。 天候によって黄化・黄斑が見られる場合あり。
ギシギシ類	ハーモニー75DF水和剤	作物3～4葉期	2g	1	砂土では使用しない。 茎葉処理剤のためギシギシの葉が展開してから行う。

注1）アトラジンを含む農薬（ゲザノンゴールド、ゲザプリムフロアブル）の総使用回数は1回

注2）デュアルゴールドを土壌処理剤として使用した場合、総使用回数によりゲザノンゴールドを茎葉処理剤として使用することはできません。