

当面の技術対策（畜産編）

令和6年5月15日

発行：ゆとりみらい2 1 農業推進協議会指導部会

1 草地管理

本年度は萌芽が早く、1 番草収穫も早まることが予想されます。収穫作業に向け、取り付け道路の整備やスタックサイロの準備、資材の確認を早めに行いましょう。

2 サイレージ用とうもろこしの除草作業

サイレージ用とうもろこしのは種作業は順調に進んでいます。茎葉処理のタイミングも早まることが予想されるため、資材の確認を行いましょう。

表1 サイレージ用とうもろこしの主な茎葉処理除草剤

主な対象雑草	除草剤名	使用時期	10a 当り 使用量	使用回数	主な注意事項
1 年生雑草	アルファード 液剤	作物 3～5 葉期	100～150ml	1	散布時の展開葉に薬害（黄斑）を生じる場合がある。 イヌホオズキ・シロザ・イチビに効果がある。
		作物 6～7 葉期	150ml		
1 年生雑草	ブルーシア フロアブル	作物 3～5 葉期	40～50ml	1	散布時の展開葉に薬害（黄斑）を生じる場合があるが、その後の生育には影響がない。 イヌホオズキ・シロザ・イチビに効果がある。 雑草発生の多い圃場では、土壌処理剤との併用が望ましい。
		作物 6～7 葉期	50～75ml		
1 年生雑草	ゲザノン ゴールド	作物 2～4 葉期	140～200ml	1	砂土では使用しない。 極端な過湿土壌および砂質土壌では生育が抑制することがあるので薬量を少なくする。（注1）（注2）
1 年生 広葉雑草	ゲザプリム フロアブル	作物 2～4 葉期	100～200ml	1	砂土系で透水性のよい圃場や、多雨の降雨が続く時期の散布は薬害の恐れがあるので使用を避ける。（注1）
1 年生雑草	ワンホープ 乳剤	作物 3～5 葉期	100～150ml	1	品種により薬害が生じる恐れがある。 散布数日後一時的に褪色及び生育抑制を生ずることがある。 シバムギ・レッドトップに効果がある。
1 年生雑草 及び 多年生イネ 科雑草	ワンホープ エース OD	作物 3～5 葉期	100～200ml	1	品種により薬害が生じる恐れがある。 天候によって黄化・黄斑が見られる場合あり。 シバムギ・リードカナリーグラスに効果がある。
ギシギシ類	ハーモニー 75DF 水和剤	作物 3～4 葉期	2g	1	砂土では使用しない。 茎葉処理剤のためギシギシの葉が展開してから行う。

注1) アトラジンを含む農薬（ゲザノンゴールド、ゲザプリムフロアブル）の総使用回数は1回

注2) デュアルゴールドを土壌処理剤として使用した場合、総使用回数によりゲザノンゴールドを茎葉処理剤として使用することはできません。