

畜産 FAX 情報 第 7 号

令和 6 年 8 月 15 日

発行：ゆとりみらい 21 農業推進協議会指導部会

1. 二番草収穫後のギシギシの駆除

ギシギシ類の葉が手のひらくらいの大きさに展開した頃（草丈 15cm～20cm）が除草剤散布の目安となります。

アージラン液剤は「秋処理/最終採草後」に使用する薬剤ですが、高温時（最高気温 25 度以上）では、薬害が生じるおそれがあるので使用しないで下さい。高温が続く場合はハーモニー DF 水和剤を使用して下さい。

2. サイレージ用とうもろこしの収穫時期

85～90 日クラスのサイレージ用とうもろこしは、は種日から単純積算気温が約 2,200～2,300 度で黄熟期を迎えます（図 1）。5 月 1 日から 8 月 13 日（現在）までの単純積算温度は 1,767 度で、黄熟期は 9 月 5 日（平年 9 月 16 日）の見込みです（図 1）。今後の気温によっては登熟がさらに早まる可能性があるため、ほ場を確認し、早めの収穫準備を行いましょう（表 1）。





図 1 単純積算温度の推移

表 1 黄熟期の判定方法

- ・ 子実表面の水分が抜けて爪で押さえてもつぶれづらく胚乳部分がポロポロ崩れる。
- ・ 子実の品種によっては頂部が凹む。
- ・ 子実の付け根部分が黒っぽく変色する。
- ・ 子実の黄色と白色の境目（ミルクライン）が芯の方から 1/2～1/3 部分に見られる。
- ・ ミルクラインは先端側断面で評価する。



ミルクライン

3. サイレージ用とうもろこしほ場におけるつる性雑草に注意

つる性雑草（ガガイモ、ヒルガオ、アレチウリ）が増えています。つるがサイレージ用とうもろこしに巻き付いた場合、ハーベスターが詰まり、収穫作業に倍の時間がかかる事例が起きています。つる性雑草をほ場の外周で見つけた場合は、ほ場内へ侵入する前に刈り取りましょう。